

MIKROLARYNGOSKOPI

(mikroskopisk undersökning av stämbanden i narkos)

Varför undersökningen görs

Inspektion av stämbanden utförs som rutinundersökning på en Öron-, näs- och halsmottagning. Den vanligaste orsaken till att undersökningen utförs är heshet. Om man vid denna undersökning finner något sjukligt på stämbanden måste man utreda detta med en undersökning och provtagning i narkos.

Före operationen

Du får inte äta eller dricka något efter klockan 24.00 natten före operationsdagen. Vid behov får du en lugnande tablett eller nässpray innan operationen börjar.

Operationen

Eftersom stämbanden är rörliga och mycket känsliga för beröring måste ingreppet utföras under narkos. Ett metallrör (laryngoskop) förs ner i halsen och placeras med öppningen strax ovanför stämbanden. Med mikroskop kan stämbanden sedan undersökas i detalj. Olika instrument nedförs genom laryngoskopet och hela eller en del av stämbandsförändringen opereras bort. I vissa fall används laser. Vävnadsprov kan senare analyseras i mikroskop.

Efter operationen


Om du är frisk för övrigt görs ingreppet över dagen dvs du stannar inte kvar över natten på sjukhuset. Då vävnad tagits bort från stämbanden är det viktigt att du relativt röstvilar under 3 till 4 dagar, det betyder att du kan använda din röst men skapa goda akustiska rum att prata i. Räkna med en sjukskrivning på mellan 3-7 dagar och du ska då vara försiktig med röst användning. Du ska då ej tala länge i telefon, ej tala i bullrig miljö och ej röka under sjukskrivningstiden. Om du hostar efter operationen ska du behandlas med hostdämpande så att stämbanden ej svullnar och läkningen försvåras.

Du får återbesök till läkare, vanligen efter 8 veckor för kontroll och besked vad eventuellt vävnadsundersökningen visade. I vissa fall får du komma till en logoped som hjälper dig med att hitta en god röstteknik.

Risker

I sällsynta fall kan rösten bli sämre efter operation pga ärrbildning med försämrad stämbandsvibration.


Struphuvud



Vänster

Höger

Laryngoskop på plats



Mikrolaryngoskop

Källa: Samarbete med ÖNH Karolinska sjukhuset, Solna