

## MIKROLARYNGOSKOPI

(mikroskopisk undersökning av stämbanden i narkos)

### Varför gör vi en mikrolaryngoskopi

Inspektion av stämbanden utförs som rutinundersökning på en öron-, näs- och halsmottagning. Den vanligaste orsaken till att undersökningen utförs är heshet. Om man vid denna undersökning finner en sjukligt på stämbanden tas ett vävnadsprov från stämbanden i narkos. Det är vanligen den läkaren som tar beslut om operation som utförs, om inte så träffar du operatören i anslutning till operation.

### Före operationen

Du får inte äta eller dricka något efter klockan 24.00 natten före operationsdagen. Vid behov får du en lugnande medicin innan operation.

### Operationen

Eftersom stämbanden är rörliga och mycket känsliga för beröring måste ingreppet utföras under narkos. Ett metallrör (laryngoskop) förs ner i halsen och placeras med öppningen strax ovanför stämbanden. Med mikroskop kan stämbanden sedan undersökas i detalj. Olika instrument nedförs genom laryngoskopet och hela eller en del av stämbandsförändringen opereras bort. I vissa fall används laser. Vävnadsprov analyseras i av patolog under mikroskop.

### Efter operationen


Om du är frisk för övrigt görs ingreppet över dagen dvs du stannar inte kvar över natten på sjukhuset. Då vävnad tagits bort från stämbanden bör du relativt röstvila under 3 till 4 dagar, det betyder att du kan använda din röst men skapa goda akustiska rum att prata i. Räkna med en sjukskrivning på mellan 3-7 dagar. Du bör inte tala länge i telefon eller i bullrig miljö. Det är jätteviktigt att du inte röker under tiden efter operation. Om du hostar efter operationen ska du behandlas med hostdämpande så att stämbanden ej svullnar och läkningen försvåras. Du får återbesök till läkare, vanligen efter 8 veckor för kontroll och besked om vad eventuellt vävnadsundersökningen visade. I vissa fall får du komma till en logoped som hjälper dig med att hitta en god röstteknik.

### Risker


I mycket sällsynta fall kan rösten bli sämre efter operation pga ärrbildning med försämrad stämbandsvibration.

Struphuvud

Laryngoskop på plats



Vänster      Höger



Mikrolaryngoskop