

2021-01-04

Katarina Olofsson, docent, överläkare i foniatri  
Tidsbokningen 090-785 91 39

## STÄMBANDSFÅRA/CYSTA

### Allmän beskrivning

Du har en godartad förändring på ena eller båda stämbanden (stämbandsfåra och eller stämbandscysta). Dessa diagnoser är relativt ovanliga bland patienter med röstbesvär. Stämbandsfåran utgörs av en långsgående förtunning av det ytligaste lagret i slemhinnan på stämbandet. Förtunningen som uppifrån ser ut som en fåra kan vara mer eller mindre djup. Den gör stämbandskanten ojämn och stelare än normalt vilket gör att både slutningen mellan stämbanden och deras svängningsrytm kan påverkas. Stämbandsfåror kan vara enkel eller dubbelsidiga. En cysta är en rund eller oval vätskefylld bildning som sitter i själva slemhinnan, mer eller mindre djupt. Stämbandscystor kan liksom fåror vara ensidiga eller finnas på flera ställen. Cystor i stämbanden är godartade och medicinskt ofarliga.

### Symptom

Rösten är nästan alltid hes. Både vid stämbandscystor och stämbandsfåror blir den läckande och låter ofta ostadig i klangen. Om patienten tar i kraftigt för att få fram röst blir den pressad i karaktären och tonen blir ljusare. Hesheten är ofta kombinerad med trötthetskänsla och ibland ont vid ansträngning. Hals- och stämbandsmuskler blir överansträngda. Man kan ha svårt att öka röststyrkan och svårt att göra sig hörd. Att sjunga kan bli svårt eller omöjligt. I miljöer med mycket omgivningsljud blir det ännu svårare att höras. Att vara hes kan innebära ett handikapp för den drabbade såväl i yrkeslivet som privat.

### Förekomst

Ingen vet exakt hur vanligt det är med stämbandsfåra, men tillståndet betraktas som ovanligt. Hesheten börjar ofta i skolåldern men ger vanligtvis besvär först i tidig vuxenålder, när vardagen ställer större röstkrav än tidigare. 60% av patienterna är kvinnor. Stämbandsfåra kan vara vanligare i vissa familjer. Stämbandscystor uppträder i alla åldrar och i lika stor utsträckning hos kvinnor som män. Ibland kan en cysta tömmas på sitt innehåll och bli "osynlig" för ögat. Då försvinner också röstbesvären tillfälligt eller permanent.

### Orsaker

Den exakta orsaken till stämbandsfåra är okänd. Sannolikt föds man med anlagen och den bildas troligen under stämbandens mognadsfas i tonåren. Fåra är ytterst sällsynt hos barn. Det finns inget tydligt samband med röstöveransträngning. I vissa fall kan fåror bildas på grund av kronisk inflammation som leder till atrofi (förtvining) av det ytliga lagret på

2021-01-04

Katarina Olofsson, docent, överläkare i foniatri  
Tidsbokningen 090-785 91 39

stämbandskanten. Stämbandscystor kan vara medfödda (epidermala cystor) men också en ombildad samling körtelceller (s.k. inklusionscysta). Inklusions-cystor kan bildas när en körtelgång täpps till i samband med inflammation i vävnaden.

### **Behandling**

Rösttröttheten vid stämbandsfåra och stämbandscystor kan behandlas med röstterapi hos logoped, men denna behandling kan inte "bota" rösten. Däremot räcker det ofta för att patienten skall kunna leva utan större röst problem. Cystor opereras vanligtvis sedan med mycket gott resultat. Rösten kan bli normal. Stämbandsfåra opereras i utvalda fall. Resultatet brukar bli en förbättring av röstklängen och funktionen men sällan en normalisering.